LA RAIE PASTENAGUE AMERICAINE

Hypanus americanus

ORDRE | Rajiformes **FAMILLE |** Dasyatidae

COMMENT LE RECONNAITRE ?

- museau et extrémités des nageoires pectorales pointus
- rangée de courtes épines recouvrant la ligne médiane de la surface du dos
- un ou deux dards venimeux à la base de la queue

Couleur : dos marron, noir (ou gris olive chez les juvéniles)

Taille moyenne observée : 150 cm

DONNÉES DÉFICIENTES

Indice de résilience: Faible

Indice de vulnérabilité: Très élevé

REPRODUCTION

Ovovivipare

- **Maturité sexuelle**
  ♀ 75 - 80 cm
  ♂ 50 cm
- **Nombre de petits** 2 - 7
- **Taille** 17 - 19 cm
- **Cycle de reproduction** annuel
- **Période de reproduction** automne / début hiver
- **Période de naissance** avril
- **Temps de gestation** 5 - 8 mois

ALIMENTATION

ESPERANCE DE VIE

12 ans

Habitat
Zones côtières saumâtres

Type de substrat
Fonds sableux, récifales

Profondeur moyenne
0 - 55 m

Menaces principales :

ND

Vulnérabilité :

- **Espèce côtière** (dans les eaux < 10 m)
- **Espèce à faible fécondité** (2 à 6 juvéniles par portée)
- **Formation d 'agrégations** (lors de la reproduction)
- **Changement de comportement** si présence de nourrissage par l'homme (trace de prédation intra-espèce et de bateau, parasites, agression...)