

LE REQUIN NOURRICE

Ginglymostoma cirratum

ORDRE | Carcharhiniformes

FAMILLE | Carcharhinidae



© Flickr/V.Clavier

COMMENT LE RECONNAITRE ?

- corps cylindrique aplati
- pupilles horizontales
- 2 barbillons
- 2 nageoires dorsales situées en arrière
- lobe inférieur de la nageoire caudale absent
- (juvéniles) petites taches sombres

 **Couleur :** fauve à brun-gris, denticules blanches et noires

 **Taille moyenne observée :** 300 cm

DONNÉES DÉFICIENTES

Indice de résilience:

Faible

Indice de vulnérabilité:

Très élevé

REPRODUCTION

Ovovipare

• Maturité sexuelle

♀ 230 - 240 cm

♂ 210 cm

• Nombre de petits

20 - 30

Taille

27 - 30 cm

• Cycle de reproduction

tous les 2 ans

• Période de reproduction

juin - juillet

• Période de naissance

novembre - décembre

• Temps de gestation

5 - 6 mois

ALIMENTATION



ESPERANCE DE VIE

25 ans

Menaces principales :



- Pêche accidentelle et ciblée (filet et casier)
- Dégradation habitat

Vulnérabilité :

- **Espèce côtière** durant une importante partie de son cycle de vie
- **Espèce philopatrise**
- **Formation d'agrégations** au stade juvénile
- **Espèce migratrice**
- **Domaine vital** de petite taille

Habitat

Zones côtières

Type de substrat

Fonds rocheux, récifs, mangroves

Profondeur moyenne

0 - 35 m

